

Réalisations de Bigèbres (II) : Théorème de Dualité.

Eric Murre

February 1, 2008

Abstract

In [1] a method for realizations of bialgebras is presented . It allows to construct algebras of linear operators wich are endowed with a bialgebra structure : $U_x(\Delta, \epsilon)$. The initial data for such a construction is a linear application :

$$x : L \rightarrow \text{Invd}(F) ,$$

where L and F are two coalgebras that are supposed of finite dimensions in this article , and where $\text{Invd}(F)$ denotes the algebra of right invariant operators on any coalgebra F . $T(L)$ and $T(F)$ denote the tensor algebras which are equiped with their bialgebra structures extending, by algebra morphisms, the coproducts and counits defined on L , resp on F . Let us recall shortly the construction .

The linear application $x : L \rightarrow \text{Invd}(F)$ and the coalgebra structure of L allow to extend for any $l \in L$, $x(l)$ into an operator $X(l)$ not only defined on F , but defined on $T(F)$ in the following manner : for w_1 and w_2 in $T(F)$,

$$X(l)(w_1.w_2) = \sum_k X(l'_k)(w_1).X(l''_k)(w_2)$$

where

$$\Delta_L(l) = \sum_k l'_k \otimes l''_k .$$

In [1] it is shown that the algebra generated in $End(T(F))$ by the operators $X(L)$ and the identity is a bialgebra : $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$, which is included in $Invd(T(F))$.

Then the duality theorem is expressed in the following way :

By taking the transposition of the application :

$$x : L \rightarrow Invd(F)$$

we obtain :

$$x^t = y : F \rightarrow Invd(L) ,$$

and by applying the previous results to x and y we obtain two bialgebras $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$ and $V_y(\Delta_F, \epsilon_F)$, and two bialgebra morphisms mapping units onto units

$$\pi_x : T(L) \rightarrow U_x \subset Invd(T(F)) \subset End(T(F)) ,$$

$$\pi_y : T(F) \rightarrow V_y \subset Invd(T(L)) \subset End(T(L)) .$$

By denoting for any coalgebra C , the canonical duality between $c \in C$ and $A \in Invd(C) : \epsilon_C \circ A(c) = \langle A, c \rangle$, then we have :

Théorème 0.1 *Duality theorem*

For any $w \in T(L)$ and $v \in T(F)$ the following identity holds :

$$\langle \pi_x(w), v \rangle = \langle \pi_y(\tau(v)), \tau(w) \rangle ,$$

where τ denotes the anti-isomorphism of tensor algebras which reverses the order of tensors .

Then this theorem is used to prove properties of the ideal of relations associated to any realized bialgebra $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$.

In particular the vector spaces of relations of order less or equal to n in $T(L)$, are shown to be coideals , for any n . Then we describe two complementary constructions of these coideals .

One of these constructions relies on the following characterization of the vector space of relations of U_x contained in a subcoalgebra C of $T(L)$: it coincides with the maximal coideal of C contained in the set of relations defined by the minimal representation, on $\mathbb{C} \oplus F$.

CPT 2005 /P.004

Centre de Physique Théorique , CNRS , Luminy, case 907 , 13288 Marseille Cedex 9 , France .

1 Introduction .

L'article " Remarques sur une méthode de réalisations de bigèbres, et algèbres de Hopf associées à certaines réalisations " [1] , présente une méthode générale, qui permet de construire des algèbres d'opérateurs linéaires, qui sont munies d'une structure de bigèbre.

Une bigèbre est une algèbre associative (sur $\mathbb{C}$), U , munie d'un coproduit coassociatif ,

$\Delta : U \rightarrow U \otimes U$, qui est un morphisme d'algèbres , et d'une counité

$\epsilon : U \rightarrow \mathbb{C}$, qui est un morphisme d'algèbres , et qui vérifient :

$$\epsilon \otimes id \circ \Delta = id \otimes \epsilon \circ \Delta = id : U \rightarrow U .$$

Soient deux cogèbres , $L(\Delta_L, \epsilon_L)$ et $F(\Delta_F, \epsilon_F)$, les algèbres tensorielles $T(L)$ et $T(F)$ sont munies de structures de bigèbres qui étendent par morphismes d'algèbres les structures de cogèbres de L et respectivement de F .

Dans le cas général de cogèbres L et F de dimensions quelconques ,voir(1), il y a des précautions à prendre pour définir des sous algèbres d'opérateurs invariants à droite sur les cogèbres L , F , et surtout sur, $T(L)$ et $T(F)$.

Dans cet article on suppose que les cogèbres L et F sont de dimensions finies et pour fixer les notations on notera respectivement K et E les algèbres associatives , avec unités , dont L , respectivement F , sont les cogèbres duales:

$$L(\Delta_L, \epsilon_L) = K^* \text{ et } F(\Delta_F, \epsilon_F) = E^* .$$

Alors les algèbres d'opérateurs invariants à droite sont bien définies ; on les désignera par $Invd(L)$, $Invd(F)$, $Invd(T(L))$, et $Invd(T(F))$. Ces algèbres sont vectoriellement isomorphes aux duals des cogèbres correspondantes.

Les données initiales pour la réalisation d'une bigèbre sont :

deux cogèbres $L(\Delta_L, \epsilon_L)$ et $F(\Delta_F, \epsilon_F)$ et une application linéaire x :

$$x : L \rightarrow Invd(F) .$$

Alors cette application linéaire x et la structure de cogèbre de $L(\Delta_L, \epsilon_L)$ permettent, pour tout vecteur $l \in L$, d'étendre de manière unique l'opérateur $x(l)$ en un opérateur $X(l)$, non plus simplement de : $F \rightarrow F$, mais

de : $T(F) \rightarrow T(F)$, de la façon suivante :
pour w_1 , w_2 dans $T(F)$:

$$X(l)(w_1.w_2) = \sum_k X(l'_k)(w_1).X(l''_k)(w_2)$$

où

$$\Delta(l) = \sum_k l'_k \otimes l''_k .$$

L'algèbre engendrée par les opérateurs $X(l)$, $l \in L$ et l'opérateur identité dans $End(T(F))$ est alors munie d'une structure de bigèbre notée:

$$U_x(\Delta_L, \epsilon_L) ; \text{ avec } : \Delta_L X(l) = \sum_k X(l'_k) \otimes X(l''_k) ;$$

elle agit sur $T(F)$.

Les opérateurs $X(l) \in Invd(T(F))$ sont des opérateurs invariants à droite sur $T(F)$:

$$U_x(\Delta_L, \epsilon_L) \subset Invd(T(F)) \subset End(T(F)).$$

De plus l'on obtient alors un morphisme d'algèbres préservant l'unité :

$$\pi_x : T(L) \rightarrow U_x(\Delta_L, \epsilon_L) \subset Invd(T(F))$$

qui est aussi un morphisme de cogèbres.

Le paragraphe 2 rappelle les théorèmes décrivant la réalisation de bigèbres de [1] dans le cas où L et F sont de dimensions finies .

Le paragraphe 3 est consacré à la démonstration du théorème de dualité que l'on décrit maintenant .

La construction précédente est associée à toute application linéaire x d'une cogèbre L dans l'espace des opérateurs invariants à droite sur une cogèbre F .

Parce que le dual d'une cogèbre de dimension finie est canoniquement isomorphe à l'espace vectoriel des opérateurs invariants à droite sur cette cogèbre , par transposition de l'application $x : L \rightarrow Invd(F)$ on obtient, l'application linéaire $y : F \rightarrow Invd(L)$:

$$x^t = y : F \rightarrow Invd(L) .$$

On obtient ainsi :
 Une application linéaire

$$Y : F \rightarrow \text{Invd}(T(L)) ,$$

la bigèbre :

$$V_y(\Delta_F, \epsilon_F) \subset \text{Invd}(T(L))$$

et un morphisme d'algèbres π_y :

$$\pi_y : T(F) \rightarrow V_y(\Delta_F, \epsilon_F) \subset \text{Invd}(T(L)) ,$$

qui est aussi un morphisme de cogèbres .

Pour tout opérateur $a \in \text{Invd}(C)$ et tout $c \in C$, où C est une cogèbre on dénote la dualité entre a et c par : $\langle a, c \rangle$,

$$\epsilon_C \circ a(c) = \langle a, c \rangle .$$

En désignant , pour tout espace vectoriel V par $T_0(V)$ la sous algèbre tensorielle suivante ,

$$T_0(V) = V \oplus V \otimes V \oplus \dots \oplus \otimes^n V \oplus \dots ,$$

et par τ l'anti-isomorphisme d'algèbre tensorielle correspondant au renversement de l'ordre des tenseurs ,

alors le théorème de dualité s'exprime de la façon suivante :

Théorème 1.1 *Théorème de Dualité.*

Pour toutes suites $(l_1, l_2, \dots, l_p)$, $l_i \in L$ et $(f_1, f_2, \dots, f_q)$, $f_j \in F$, nous avons :

$$\langle X(l_1) \circ X(l_2) \circ \dots \circ X(l_p), f_1 \otimes f_2 \otimes \dots \otimes f_q \rangle$$

est égal à

$$\langle Y(f_q) \circ Y(f_{q-1}) \circ \dots \circ Y(f_1), l_p \otimes l_{p-1} \otimes \dots \otimes l_1 \rangle .$$

Et plus généralement , pour tous vecteurs $w \in T(L)$ et $v \in T(F)$ l'on a :

$$\langle \pi_x(w), v \rangle = \langle \pi_y(\tau(v)), \tau(w) \rangle .$$

Le paragraphe (4) est consacré à l'étude de propriétés concernant les idéaux de relations des bigèbres réalisées . En particulier il y est démontré que pour tout n , l'espace vectoriel, $R_n(U_x)$, des relations d'ordre n d'une bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$ est un coidéal de $T(L)$.

L'espace vectoriel $R_n(U_x)$ des relations d'ordre n de la bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$ étant le noyau de l'application:

$$\pi_x : T_n(L) \rightarrow U_x \subset \text{Invd}(T(F)) ,$$

où

$$T_n(L) : \mathbb{C} \oplus L \oplus L \otimes L \oplus .. \oplus \otimes^n L .$$

La propriété de $R_n(U_x)$ d'être un coidéal de $T_n(L)$ est démontrée dans le théorème 4.1 :

Théorème 1.2 *Pour toute bigèbre réalisée , $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$, et pour tout n , l'on a :*

$$\Delta_L(R_n(U_x)) \subset R_n(U_x) \otimes T_n(L) + T_n(L) \otimes R_n(U_x) .$$

D'autre part on obtient , toujours comme conséquences du théorème de dualité, deux constructions , complémentaires et utiles , des coidéaux de relations d'ordre n .

La première construction provient de la caractérisation des coidéaux de relations de la bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$ comme les coidéaux , de relations définies par la représentation minimale , en l'occurrence la représentation de U_x sur $\mathbb{C} \oplus F$ (théorèmes 4.3 , 4.4 , paragraphe 4.2) .

Cette caractérisation des coidéaux de relations de la bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$ est intéressante ; par exemple elle pourrait permettre de trouver des solutions au problème de la réalisation de bigèbres admettant l'action d'opérateurs particuliers .

Pour la position du problème de l'existence de l'antipode sur une bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$, lorsque par exemple K est trigonalisable , voir [1] .

Cette première construction des coidéaux $R_n(U_x)$ est démontrée dans le théorème 4.4 et consiste dans les opérations suivantes .

Soit le sous espace vectoriel R_n^1 de $T_n(L)$ défini par le noyau de π_x^1 :

$$R_n^1 = T_n(L) \cap \ker \pi_x^1 , \quad \pi_x^1 : T(L) \rightarrow \text{Invd}(F) \subset \text{Invd}(T(F)) .$$

L'algèbre $T_n(K)$ est le dual de $T_n(L)$ et l'orthogonal dans $T_n(K)$ de R_n^1 est un sous espace vectoriel $W_n \subset T_n(K)$ de l'algèbre $T_n(K)$.
 Soit $B(W_n)$ la plus petite sous algèbre de $T_n(K)$ contenant W_n et l'unité de $T_n(K)$;
 on a alors :

Théorème 1.3 *L'orthogonal dans $T_n(L)$ de la sous algèbre $B(W_n)$ est $R_n(U_x)$, le coidéal des relations d'ordre n .*

Finalement , dans cet article , on expose une construction complémentaire, issue du théorème 4.1 , des coidéaux $R_n(U_x)$ dans le théorème 4.5 .

De plus l'on remarque dans ce paragraphe 4 , que les résultats restent valables, non plus simplement pour les sous espaces vectoriels des relations de la bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$ contenues dans les cogèbres $T_n(L)$, mais pour l' espace vectoriel des relations contenues dans une sous cogèbre(de dimension finie), arbitraire , de $T(L)$.

Pour les propriétés et les définitions usuelles des algèbres, cogèbres, et des algèbres de Hopf voir [2] . En ce qui concerne les constructions des groupes quantiques et leurs études , ainsi que les applications et leurs origines voir [3],[4],[5] et les références qui y sont contenues , dont l'origine en termes de C^* Algèbres. D'autre part des travaux concernent l'utilisation dans le domaine de l'analyse fonctionnelle et de la géométrie non commutative d'algèbres de Hopf particulières [6], ou encore dans le domaine de la théorie quantique des champs [7] , [8] . Signalons enfin une approche, plus axiomatique , des algèbres de Hopf en termes d'algèbres de Von Neumann.

2 Rappels sur une méthode de réalisations de bigèbres.

Dans ce paragraphe on décrit la méthode de réalisation de bigèbres publiée dans: arXiv:math-ph 0312049.

Les données initiales pour la réalisation d'une bigèbre sont les suivantes.

Soient K et E deux algèbres associatives avec unités ;

on désigne par L et F les cogèbres (coassociatives avec counités) duales de K et E . Pour tout espace vectoriel F , $T(F)$ désigne l'algèbre tensorielle construite sur F . Dans cet article on supposera pour simplifier que les algèbres

K et E sont de dimensions finies sur $\mathbb{C}$.
Alors pour toute application linéaire :

$$x_t : L \rightarrow E$$

est associée une bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$, construite de la façon suivante :
pour tout $l \in L$, $x_t(l) \in E$; et la transposition de l'opérateur multiplication à gauche dans E par $x_t(l)$ est un opérateur invariant à droite sur la cogèbre F . On désigne par x l'application linéaire de la cogèbre L dans les opérateurs invariants à droite sur la cogèbre F . L'application linéaire x et la structure de cogèbre de L permettent d'étendre les opérateurs $x(l)$ non plus simplement de $F \rightarrow F$ mais de $T(F) \rightarrow T(F)$ de la manière suivante :
pour w_1 et $w_2 \in T(F)$ on définit :

$$X(l)(w_1.w_2) = \sum_k X(l'_k)(w_1).X(l''_k)(w_2)$$

où

$$\Delta_L(l) = \sum_k l'_k \otimes l''_k$$

On obtient ainsi une application linéaire :

$$X : L \rightarrow \text{End}(T(F))$$

et pour toute base (l_i) de L , la sous algèbre de $\text{End}(T(F))$ engendrée par les opérateurs $X(l_i)$ et l'identité est alors munie d'une structure de bigèbre, que l'on désigne par $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$.

On rappelle dans ce paragraphe quelques points essentiels de la construction dont nous aurons besoin dans le paragraphe 3 pour formuler et établir le théorème de dualité et dans le paragraphe 4 pour démontrer ses applications concernant la description de propriétés de l'idéal des relations dans la bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$.

Proposition 2.1 *Pour toute cogèbre F de dimension finie, de coproduit Δ_F , et counité ϵ_F , $T(F)$ est munie d'une structure de bigèbre notée: $T(F)(\Delta_F, \epsilon_F)$. Soit $\text{Invd}(T(F))$ la sous algèbre de $\text{End}(T(F))$, formée par les opérateurs X , invariants à droite, vérifiant :*

$$\Delta_F \circ X = X \otimes id \circ \Delta_F .$$

L'application linéaire

$$X \in Invd(T(F)) \rightarrow \omega_X = \epsilon_F \circ X \in T(F)^*$$

est un anti-morphisme d'algèbres; l'application inverse est donnée par:

$$X = \omega_X \otimes id \circ \Delta_F .$$

Nous avons :

$$T(F) = C \oplus F \oplus F \otimes F \oplus \dots \oplus \otimes^n F \oplus \dots$$

Le coproduit Δ_F et la counité ϵ_F sont des morphismes d'algèbres respectivement de $T(F) \rightarrow T(F) \otimes T(F)$ et de $T(F) \rightarrow \mathbb{C}$.

Pour $1 \in \mathbb{C}$, $\Delta_F(1) = 1 \otimes 1$ et $\epsilon_F(1) = 1$;

pour $f \in F \subset T(F)$, le coproduit Δ_F , coïncide avec le coproduit sur F , ainsi que la counité .

F étant le dual d'une algèbre de dimension finie E par hypothèse, en prenant une base e_i pour E on obtient la base canonique duale f_i pour F et donc la base canonique associée sur $T(F)$.

Si on note :

$$\Delta f_i = \sum_k f'_{i,k} \otimes f''_{i,k}$$

on a :

$$\Delta_F(f_{i1} \otimes f_{i2} \otimes \dots \otimes f_{in}) = \sum_{k1, k2, \dots, kn} (f'_{i1, k1} \otimes f'_{i2, k2} \otimes \dots \otimes f'_{in, kn}) \otimes (f''_{i1, k1} \otimes f''_{i2, k2} \otimes \dots \otimes f''_{in, kn})$$

$\epsilon_F : T(F) \rightarrow \mathbb{C}$ étant un morphisme d'algèbres de $T(F) \rightarrow \mathbb{C}$, on a bien par exemple :

$$\epsilon_F(f_{i1} \otimes f_{i2} \otimes \dots \otimes f_{in}) = \epsilon_F(f_{i1}) \cdot \epsilon_F(f_{i2}) \dots \epsilon_F(f_{in}) ,$$

$$id \otimes \epsilon_F(\Delta_F(f_{i1} \otimes f_{i2} \otimes \dots \otimes f_{in})) = f_{i1} \otimes f_{i2} \otimes \dots \otimes f_{in} .$$

$T(F)$ étant une bigèbre l'algèbre des opérateurs invariants à droite

$$Invd(T(F)(\Delta_F, \epsilon_F)) \subset End(T(F))$$

est l'algèbre des opérateurs $X \in \text{End}(T(F))$ qui vérifient :

$$\Delta_F \circ X = X \otimes id \circ \Delta_F \quad .$$

Les formes $\omega \in T(F)^*$ étant munies du produit associatif :

$$\omega_1 . \omega_2 = \omega_1 \otimes \omega_2 \circ \Delta_F \quad ,$$

alors l'application linéaire :

$$i : X \in \text{Invd}(T(F)) \rightarrow i(X) = \epsilon_F \circ X \in T(F)^*$$

est un anti-morphisme d'algèbres .

Cette dualité entre les opérateurs $X \in \text{Invd}(T(F))$ et $c \in T(F)$ sera souvent notée par:

$$\langle X, c \rangle = \epsilon_F(X(c)) \quad .$$

Dans les théorèmes suivants on décrit des résultats obtenus dans [1].

Théorème 2.1 *Soient deux cogèbres $L(\Delta_L, \epsilon_L)$ et $F(\Delta_F, \epsilon_F)$, et une application linéaire x ,*

$$x : L \rightarrow \text{Invd}(F)$$

alors il existe une unique application linéaire X :

$$X : L \rightarrow \text{Invd}(T(F))$$

telle que:

- 1) *pour $1 \in T(F)$, $X(l)(1) = \epsilon(l)1$,*
- 2) *pour $f \in F \subset T(F)$, $X(l)(f) = x(l)(f)$,*
- 3) *pour tout $w_1, w_2 \in T(F)$ alors :*

$$X(l)(w_1 . w_2) = \sum_k X(l'_k)(w_1) . X(l''_k)(w_2) \quad .$$

4) *Les opérateurs $X(l)$ sont des opérateurs invariants à droite sur $T(F)$, et ils vérifient :*

$$5) X(l)(\otimes^n F) \subset \otimes^n F$$

La démonstration de ce théorème est donnée dans [1] dans un cadre un peu plus général que celui présenté ici, d'une application linéaire x , d'une cogèbre L de dimension finie, à valeurs dans les invariants à droite sur une cogèbre F de dimension finie.

Théorème 2.2 *Soient deux cogèbres $L(\Delta_L, \epsilon_L)$ et $F(\Delta_F, \epsilon_F)$, et une application linéaire x ,*

$$x : L \rightarrow \text{Invd}(F)$$

et X l'unique application linéaire :

$$X : L \rightarrow \text{Invd}(T(F))$$

définie dans le théorème précédent.

Alors l'algèbre U_x engendrée par les opérateurs $X(l) \in \text{Invd}(T(F))$ et l'identité est munie d'une structure de bigèbre : $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$, le coproduit et la counité qui sont des morphismes d'algèbres sont définis sur les générateurs par :

$$\begin{aligned}\Delta_L(X(l)) &= X \otimes X \circ \Delta_L(l) \quad . \\ \epsilon_L(X(l)) &= \epsilon_L(l)\end{aligned}$$

La démonstration est donnée dans [1] ; le point essentiel qui permet de montrer que le coproduit $\Delta_L : U_x \rightarrow U_x \otimes U_x$ est bien défini, repose sur le fait que les opérateurs $X(l)$ sont des opérateurs invariants à droite sur la bigèbre $T(F)$. En ce qui concerne la counité de U_x on a par exemple, pour tout opérateurs $u \in U_x$:

$$\epsilon_L(u).1 = u(1) \quad ; \quad \text{et} \quad u(1.w) = \sum_k u'_k(1).u''_k(w) \quad .$$

pour tout $w \in T(F)$, ce qui démontre bien: $\epsilon_L \otimes id \circ \Delta_L(u) = u$.

3 Théorème de Dualité .

Soient $L(\Delta_L, \epsilon_L)$ et $F(\Delta_F, \epsilon_F)$ des cogèbres de dimensions finies, avec counités. Ces deux cogèbres sont les duals des algèbres associatives K et E . La donnée de l'application linéaire :

$$x : L \rightarrow \text{Invd}(F)$$

est équivalente à la donnée d'une application linéaire x_t :

$$x_t : L \rightarrow E$$

et la transposition de cette application donne une application y_t :

$$y_t : F \rightarrow K$$

et donc une application linéaire y :

$$y : F \rightarrow \text{Invd}(L) \quad .$$

Ainsi en appliquant les théorèmes précédents aux applications x et y on obtient les deux applications linéaires X et Y :

$$X : L \rightarrow \text{Invd}(T(F))$$

$$Y : F \rightarrow \text{Invd}(T(L))$$

les bigèbres :

$$U_x(\Delta_L, \epsilon_L) \subset \text{Invd}(T(F))$$

$$V_y(\Delta_F, \epsilon_F) \subset \text{Invd}(T(L)) \quad .$$

et deux morphismes de bigèbres π_x et π_y préservant l'unité ,

$$\pi_x : T(L) \rightarrow U_x(\Delta_L, \epsilon_L) \subset \text{Invd}(T(F)) \subset \text{End}(T(F))$$

$$\pi_y : T(F) \rightarrow V_y(\Delta_F, \epsilon_F) \subset \text{Invd}(T(L)) \subset \text{End}(T(L)) \quad .$$

Le théorème suivant met en évidence une relation de dualité entre ces deux bigèbres .

Définitions

Pour tout élément c d'une cogèbre C et tout opérateur A invariant à droite sur la cogèbre C , on note :

$$\langle A, c \rangle = \epsilon_C \circ A(c) \quad .$$

De plus, précisons ici que dans le théorème suivant, les cogèbres sont respectivement $T(F)$ et $T(L)$ et que les opérateurs invariants à droite concernés sont ceux qui sont respectivement dans U_x et V_y .

Pour toute algèbre tensorielle sur V on désigne par τ l'anti-isomorphisme d'algèbre tensorielle correspondant au renversement de l'ordre des tenseurs, et

$$T_0(V) = V \oplus V \otimes V \oplus \dots \oplus \otimes^n V \oplus \dots .$$

Théorème 3.1 *Pour toutes suites $(l_1, l_2, \dots, l_p)$, $l_i \in L$ et $(f_1, f_2, \dots, f_q)$, $f_j \in F$, nous avons :*

$$\langle X(l_1) \circ X(l_2) \circ \dots \circ X(l_p), f_1 \otimes f_2 \otimes \dots \otimes f_q \rangle$$

est égal à

$$\langle Y(f_q) \circ Y(f_{q-1}) \circ \dots \circ Y(f_1), l_p \otimes l_{p-1} \otimes \dots \otimes l_1 \rangle .$$

Et pour $w \in T_0(L)$ et $v \in T_0(F)$ l'on a :

$$\langle \pi_x(w), v \rangle = \langle \pi_y(\tau(v)), \tau(w) \rangle .$$

De plus cette identité reste vraie pour tout $w \in T(L)$ et tout $v \in T(F)$.

Démonstration.

Pour toute application $x : L \rightarrow \text{Invd}(F)$ il existe un unique élément $w \in K \otimes E$ tel que:

$$x_t(l) = l \otimes id(w) ,$$

et

$$y_t(f) = id \otimes f(w) .$$

Nous avons ;

$$\langle X(l), f \rangle = \epsilon_F(X(l)(f)) = \epsilon_F \circ x(l) \otimes \epsilon_F \circ \Delta_F(f))$$

ce qui s'écrit :

$$\langle X(l), f \rangle = f(x_t(l)) = l \otimes f(w)$$

De même nous avons:

$$\langle Y(f), l \rangle = \epsilon_L(Y(f)(l)) = \epsilon_L \circ y(f) \otimes \epsilon_L \circ \Delta_L(l) = l \otimes f(w) .$$

Nous avons donc :

$$< X(l), f > = < Y(f), l > .$$

Calculons maintenant:

$$< X(l_1) \circ X(l_2) \circ \dots \circ X(l_p), f > ,$$

ce qui s'écrit :

$$< X(l_p) \otimes X(l_{p-1}) \otimes \dots \otimes X(l_1), \Delta_F^{p-1}(f) > ,$$

parceque d'après la proposition (2,1) on sait que l'on a un anti-isomorphisme entre les opérateurs invariants à droite sur une cogèbre et l'algèbre des formes sur cette cogèbre . D'autre part:

$$< Y(f), l_p \otimes l_{p-1} \otimes \dots \otimes l_1 > ,$$

est égal à :

$$< \otimes^p Y \circ \Delta_F^{p-1}(f), l_p \otimes l_{p-1} \otimes \dots \otimes l_1 > ,$$

par construction des opérateurs $Y(f)$ et parce que ϵ_L est un morphisme d'algèbres de $T(L)$ dans $\mathbb{C}$. Et en utilisant les identités

$< X(l), f > = < Y(f), l > ,$ l'on obtient :

$$< Y(f), l_p \otimes l_{p-1} \otimes \dots \otimes l_1 > = < X(l_1) \circ X(l_2) \circ \dots \circ X(l_p), f > .$$

Calculons maintenant :

$$< X(l_1) \circ X(l_2) \circ \dots \circ X(l_p), f_1 \otimes f_2 \otimes \dots \otimes f_q > .$$

qui est égal à

$$< \Delta_{U_x}^{q-1}(X(l_1) \circ X(l_2) \circ \dots \circ X(l_p)) , f_1 \otimes f_2 \otimes \dots \otimes f_q > .$$

En utilisant les faits que $\Delta_{U_x}^{q-1}$ est un morphisme d'algèbres, ainsi que ϵ_F est un morphisme d'algèbres ($T(F) \rightarrow \mathbb{C}$), et la formule de définition des opérateurs $X(l)$ on obtient:

$$< X(l_1^{(1)}) \circ X(l_2^{(1)}) \dots \circ X(l_p^{(1)}), f_1 > < X(l_1^{(2)}) \circ X(l_2^{(2)}) \dots \circ X(l_p^{(2)}), f_2 > \dots < X(l_1^{(q)}) \circ X(l_2^{(q)}) \dots \circ X(l_p^{(q)}), f_q >$$

où pour chaque $i \in (1, \dots, p)$,

$$\Delta_L^{q-1}(l_i) = l_i^{(1)} \otimes l_i^{(2)} \otimes \dots \otimes l_i^{(q)}$$

ce qui invoque une sommation bien définie.

D'autre part calculons:

$$< Y(f_q) \circ Y(f_{q-1}) \circ \dots \circ Y(f_1) , l_p \otimes l_{p-1} \otimes \dots \otimes l_1 > .$$

Les opérateurs $Y(f)$ étant des opérateurs invariants à droite sur $T(L)$, on obtient en utilisant l'anti-isomorphisme entre l'algèbre des opérateurs invariants à droite sur $T(L)$ et l'algèbre des formes associées définies sur $T(L)(\Delta_L, \epsilon_L)$:

$$< Y(f_1), l_p^1 \otimes l_{p-1}^1 \otimes \dots \otimes l_1^1 > < Y(f_2), l_p^2 \otimes l_{p-1}^2 \otimes \dots \otimes l_1^2 > \dots < Y(f_q), l_p^q \otimes l_{p-1}^q \otimes \dots \otimes l_1^q > ,$$

en ayant aussi utiliser le fait que Δ_L^{q-1} est un morphisme d'algèbres .
Et en utilisant les identités déjà démontrées :

$$< Y(f), l_p \otimes l_{p-1} \otimes \dots \otimes l_1 > = < X(l_1) \circ X(l_2) \circ \dots \circ X(l_p), f > ,$$

on obtient le théorème de dualité , l'extension sur $T(L)$ et $T(F)$ est une conséquence des définitions .

4 Dualité et description de propriétés des idéaux de relations des bigèbres réalisées .

Dans ce paragraphe il est naturel d'utiliser les notations suivantes.

Soient $T(L)$ ou $T(F)$:

$$T_0(L) = L \oplus L \otimes L \oplus \dots \oplus \otimes^n L \oplus \dots ;$$

c'est une sous algèbre et une sous cogèbre de $T(L)$;

$$T_n(L) = \mathbb{C} \oplus L \oplus L \otimes L \oplus \dots \oplus \otimes^n L$$

D'après les théorèmes du paragraphe (2) pour tout $w \in K \otimes E$ on a un morphisme

$$\pi_x : T(L) \rightarrow U_x \subset \text{Invd}(T(F)) \subset \text{End}(T(F))$$

donné sur les générateurs par $\pi_x(l) = X(l)$ et $\pi_x(1) = id$.

Le morphisme d'algèbres π_x est aussi un morphisme de cogèbres:

$$\pi_x : T(L) \rightarrow U_x(\Delta_L, \epsilon_L) .$$

De plus π_x est non seulement une représentation de la bigèbre $T(L)$ sur $T(F)$ mais c'est une action sur cette algèbre:

$$\pi_x(z)(w_1.w_2) = \pi_x(z^1)(w_1).\pi_x(z^2)(w_2)$$

pour tout $z \in T(L)$ et tout $w_1, w_2 \in T(F)$.

De même on a une action de la bigèbre $T(F)$ sur l'algèbre $T(L)$, donnée par le morphisme π_y défini sur les générateurs par :

$$\pi_y(f) = Y(l) \in V_y \subset Invd(T(L)) , \pi_y(1) = id$$

$$\pi_y : T(F) \rightarrow V_y(\Delta_F, \epsilon_F) \subset Invd(T(L)) \subset End(T(L)) .$$

Définition.

L'espace vectoriel des relations d'ordre m de la bigèbre U_x est le sous espace vectoriel $R_m(U_x) \subset T_m(L)$, noyau de l'application

$$\pi_x : T_m(L) \rightarrow U_x \subset Invd(T(F)) .$$

On a de même les définitions similaires pour les espaces $R_n(V_y) \subset T_n(F)$ qui sont les noyaux des applications

$$\pi_y : T_n(F) \rightarrow V_y \subset Invd(T(L)) .$$

4.1 Les espaces de relations d'ordre m sont des coidéaux.

Théorème 4.1 *Les sous espaces vectoriels de relations $R_m(U_x)$, (d'ordre m) , respectivement $R_n(V_y)$, (d'ordre n), sont des coidéaux des bigèbres $T(L)(\Delta_L, \epsilon_L)$ respectivement $T(F)(\Delta_F, \epsilon_F)$.*

Et les idéaux de relations pour les bigèbres $U_x = \pi_x(T(L))$ et $V_y = \pi_y(T(F))$ sont des coidéaux. Ces idéaux sont engendrés par des sommes de coidéaux de dimensions finies .

Démonstration.

Un élément $w_m \in T_m(L)$ est une relation si et seulement si $\pi_x(w_m) = 0$.

D'autre part, $\pi_x(w_m)$ est un opérateur dans U_x et en particulier un opérateur invariant à droite sur $T(F)$; il est nul si et seulement si :

$$\langle \pi_x(w_m), z \rangle = 0 \text{ pour tout } z \in T(F) .$$

Le théorème de dualité nous dit donc que $w_m \in R_m(U_x)$ si et seulement si

$$\langle \pi_y(\tau(z)), \tau(w_m) \rangle = 0, \forall z \in T(F)$$

où τ désigne l'anti-isomorphisme d'algèbre tensorielle du renversement de l'ordre dans les tenseurs .

D'autre part $T_m(L)$ est une cogèbre de dimension finie, et les opérateurs invariants à droite $\pi_y(\tau(z))$, laissent invariant cette cogèbre; ils engendrent donc une sous-algèbre de dimension finie dans le dual de $T_m(L)$; le théorème de dualité exprime que $\tau(R_m(U_x))$ est précisément formé par les éléments de $T_m(L)$ qui s'annulent sur cette sous-algèbre; $\tau(R_m U_x)$ est donc un coidéal. De plus parce que $\Delta_L : T(L) \rightarrow T(L) \otimes T(L)$ est un morphisme d'algèbres , l'on a:

$$\Delta_L \circ \tau = \tau \otimes \tau \circ \Delta_L ,$$

et

$$\Delta_L(\tau(R_m)) \subset \tau(R_m) \otimes T_m(L) + T_m(L) \otimes \tau(R_m) ,$$

et donc $R_m(U_x)$ est aussi un coidéal :

$$\Delta_L(R_m(U_x)) \subset R_m(U_x) \otimes T_m(L) + T_m(L) \otimes R_m(U_x) .$$

Il est d'autre part clair que la somme des idéaux engendrés par les espaces de relations d'ordre m est l'idéal des relations de la bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$, et c'est bien un coidéal. Ce théorème valable pour toutes les bigèbres construites à partir de la donnée d'une application linéaire $x : L \rightarrow \text{Invd}(F)$ où L et F sont deux cogèbres de dimensions finies est donc aussi valable pour la bigèbre $V_y(\Delta_F, \epsilon_F)$.

Le théorème précédent permet par relations d'orthogonalités de déterminer l'ensemble des relations d'ordre m pour chaque valeur de m , mais ne donne pas de méthode de les obtenir et surtout ne dit pas si l'idéal des relations est un idéal engendré par un nombre fini de relations .

Le théorème précédent permet cependant de décrire de façon précise les conditions algébriques nécessaires et suffisantes pour l'obtention d'une ou

plusieurs relations dans la bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$, à partir de la connaissance des relations dans l'algèbre $Invd(F)$, des relations dans l'algèbre K et de l'application $x : L \rightarrow Invd(F)$. C'est ce que nous allons décrire maintenant.

Remarque.

Soient L et F les cogèbres duales des algèbres K et E et $x : L \rightarrow Invd(F)$; on rappelle que la donnée de x est exactement la donnée de

$$x_t : L \rightarrow E .$$

Soit le produit des algèbres $\otimes^n E$, $n \geq 0$; cette algèbre est notée :

$$\Pi(E) = \prod_{n \geq 0} \otimes^n E ,$$

avec $\otimes^0 E = \mathbb{C}$, son dual est la cogèbre :

$$T(F)$$

et si à $l \in L$ on associe l'élément suivant, de l'algèbre $\prod_{n \geq 0} \otimes^n E$,

$$X_t(l) = (\otimes^n x_t \circ \Delta_L^{n-1}(l))_{n \geq 0}$$

avec pour $n = 0$ la valeur $1.\epsilon(l)$. Alors l'opérateur multiplication à gauche par $X_t(l)$ agit par transposition sur $T(F)$ et cette transposition coïncide avec l'opérateur $X(l)$.

L'algèbre U_x , engendrée par les opérateurs $X(l)$ et l'identité est donc anti-isomorphe à l'algèbre engendrée par les opérateurs $X_t(l)$ et la multiplication par l'unité de $\Pi(E)$.

Le problème que l'on veut aborder est celui de l'obtention de conditions algébriques nécessaires et suffisantes pour la constuction des relations dans $U_x \subset Invd(T(F))$, à partir de la connaissance des relations dans E ou de façon équivalente dans $Invd(F)$, ainsi que des relations dans K , et de la donnée de l'application $x : L \rightarrow Invd(F)$.

Soit $w \in T_m(L)$, on considère dans $\Pi(K)$ la somme de tout les idéaux, orthogonaux à w . C'est le plus grand idéal orthogonal à w ; et l'orthogonal

de cet idéal est la plus petite sous cogèbre C_w de $T_m(L)$, contenant w . De plus $\tau(C_w)$ est aussi une sous cogèbre de $T_m(L)$ qui contient $\tau(w)$, et c'est la plus petite ; l'orthogonal dans $\Pi(K)$ de $\tau(C_w)$ est donc le plus grand idéal de $\Pi(K)$ orthogonal à $\tau(w)$.

Le théorème précédent restant valable pour toutes sous cogèbres de $T(L)$, parce que leurs images par τ restent de sous cogèbres et sont donc invariants sous l'action des opérateurs invariants à droite sur $T(L)$ et en particulier sous l'action de la bigèbre $V_y(\Delta_F, \epsilon_F)$, l'on a :

Théorème 4.2 *Soient w une relation d'ordre m et C_w la plus petite sous cogèbre de $T_m(L)$ contenant w ; $w \in R_m(U_x) \cap C_w$.*

L'on a :

$R_m(U_x) \cap C_w$ est un coidéal .

Démontrons maintenant le théorème suivant reliant les relations de U_x aux coidéaux de $T(L)$ contenus dans $\ker \pi_x^1 \cap \ker \epsilon_L$,

$$\pi_x^1 : T(L) \rightarrow \text{Invd}(F) \subset \text{Invd}(T(F))$$

Théorème 4.3 *Soit $w \in R_m(U_x)$, $w = \sum_{n \in I \subset (0..m)} w_n$, où $w_n \in \otimes^n L$. $R_m(U_x) \cap C_w$ est un coidéal de relations contenant w . L'orthogonal de ce coidéal est une sous algèbre B_w . Soit B_w^{max} un élément maximal de l'ensemble des sous algèbres contenues dans $\Pi(K)$, dont l'orthogonal contienne w et soit inclus dans*

$$\ker \epsilon_L \cap \ker (\pi_x^1 : T(L) \rightarrow \text{Invd}(F))$$

Alors l'orthogonal de B_w^{max} est un coidéal minimal de relations contenant w . Ce coidéal est contenu dans le coidéal

$$R_m(U_x) \cap C_w ,$$

où C_w est la plus petite sous cogèbre de $T(L)$ contenant w .

Démonstration.

L'orthogonal d'une telle algèbre B_w^{max} maximale, parceque c'est un coidéal de $T(L)$ contenu dans $\ker \epsilon_L \cap \ker (\pi_x^1 : T(L) \rightarrow \text{Invd}(F))$, il est alors contenu dans l'idéal des relations de U_x . En effet il suffit de démontrer que pour tout $n \geq 2$,

$$\pi_x(u)(z) = 0 \text{ pour } z \in \otimes^n F$$

pour tout u dans ce coidéal; l'on a parce que $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$ agit sur $T(F)$:

$$\pi_x(u)(z) = \pi_x^1 \otimes \pi_x^1 \otimes \dots \otimes \pi_x^1 \circ \Delta_L^{n-1}(u)(z) ;$$

par hypothèse u appartient à un coidéal C contenu dans $\ker \pi_x^1 : T(L) \rightarrow \text{Invd}(F)$; mais

$$\Delta_L^{n-1}(C) \subset C \otimes T(L) \dots \otimes T(L) + T(L) \otimes C \otimes T(L) \dots \otimes T(L) + \dots + T(L) \dots \otimes T(L) \otimes C ,$$

ce qui démontre que C est un coidéal de relations de U_x parce que

$$\pi_x^1(C) = [0] \subset \text{Invd}(F)$$

par hypothèse .

D'autre part B_w^{max} étant un élément maximal, ce coidéal de relations est minimal et contient w .

Montrons que ce coidéal est contenu dans $R_m(U_x) \cap C_w$.

Soit I l'orthogonal de C_w ; on rappelle que I est le plus grand idéal de $\Pi(K)$ orthogonal à w ; on a : $I + B_w^{max}$ est une algèbre dont l'orthogonal contient w et est contenu dans l'idéal des relations de U_x ; parce que B_w^{max} est un élément maximal, on a : $I + B_w^{max} = B_w^{max}$ et l'orthogonal de B_w^{max} est bien un coidéal contenu dans $R_m \cap C_w$.

4.2 Première construction de l'espace vectoriel des relations d'ordre m .

Le théorème suivant décrit une méthode pour obtenir par exemple l'espace vectoriel des relations d'ordre m de la bigèbre $U_x(\Delta_L, \epsilon_L)$.

Soit le sous espace vectoriel R_m^1 de $T_m(L)$ défini par le noyau de π_x^1 :

$$R_m^1 = T_m(L) \cap \ker \pi_x^1 , \quad \pi_x^1 : T(L) \rightarrow \text{Invd}(F) \subset \text{Invd}(T(F)) .$$

L'algèbre $\Pi(K)$ est le dual de $T(L)$ et l'orthogonal de R_m^1 est un sous espace vectoriel de $\Pi(K)$ de la forme :

$$W_m \oplus \prod_{n>m} \otimes^n K$$

où W_m est un sous espace vectoriel de $T_m(K)$.
 Soit $B(W_m)$ la plus petite sous algèbre de $T_m(K)$ contenant W_m et l'unité de l'algèbre $T_m(K)$;
 on a alors :

Théorème 4.4 *L'orthogonal dans $T_m(L)$ de la sous algèbre $B(W_m)$ est $R_m(U_x)$ le coidéal des relations d'ordre m .*

Démonstration :

L'orthogonal dans $T_m(L)$ de $B(W_m)$ est un coidéal de $T_m(L)$ contenu dans $\ker \epsilon_L \cap \ker \pi_x^1$; c'est donc un coidéal de relations d'ordre m d'après le thm 4.3 ; d'autre part on a vu, comme conséquence du théorème de dualité ,(thm 4.1), que l'espace des relations d'ordre m , $R_m(U_x)$ est un coidéal évidemment contenu dans $\ker \epsilon_L \cap \ker \pi_x^1$; son orthogonal est une algèbre B_m qui contient W_m et l'unité de $T_m(K)$; donc $B(W_m) \subset B_m$ et par orthogonalité on obtient que l'espace des relations d'ordre m est contenu dans l'orthogonal de $B(W_m)$, ce qui donne le théorème.

Remarque.

Les théorèmes précédents concernant les espaces de relations d'ordre m , $R_m(U_x) = T_m(L) \cap \ker \pi_x$, $\pi_x : T(L) \rightarrow U_x \subset \text{Invd}(T(F))$ se généralisent pour toutes sous cogèbres de dimensions finies de $T(L)$, en définissant l'espace des relations dans la cogèbre C par :

$R_C(U_x) = C \cap \ker \pi_x$. Ceci est dû aux faits que dans l'utilisation du théorème de dualité, toute sous cogèbre de $T(L)$ est invariante sous l'action des opérateurs $\pi_y(T(F))$, qui sont des opérateurs invariants à droite sur $T(L)$, et que l'image par l'anti -isomorphisme τ d'une cogèbre est une cogèbre .

Pour obtenir une information plus précise sur l'idéal des relations, il est utile d'avoir une description plus concrète de l'algèbre donnée par l'application du théorème de dualité dans le théorème 4.1 .

4.3 Construction complémentaire de l'espace vectoriel des relations d'ordre m .

Le théorème de dualité nous a permis de montrer que l'espace vectoriel des relations $R_m(U_x)$ est un coidéal de la cogèbre $T_m(L)$, dont le dual est $T_m(K)$. Soit $B_m \subset T_m(K)$ l'orthogonal de $R_m(U_x)$; c'est une sous algèbre de $T_m(K)$.

Le théorème précédent a donné une caractérisation de cette algèbre:
 B_m est l'algèbre engendrée par l'espace vectoriel W_m et l'unité de $T_m(K)$.
 W_m est l'orthogonal de l'espace vectoriel R_m^1 :

$$R_m^1 = T_m(L) \cap \ker(\pi_x^1 : T(L) \rightarrow \text{Invd}(F)) .$$

Nous allons montrer que B_m coïncide avec l'algèbre B^m engendrée de la façon suivante dans $T_m(K)$:

pour tout $f \in F$ soit $Y_{t,op}^m(f)$ défini par :

$$Y_{t,op}^m(f) = \sum_{n \in (0..m)} \otimes^n y_t \circ \Delta_{F,op}^{n-1}(f) \in T_m(K)$$

où $\Delta_{F,op}$ désigne le coproduit opposé sur F ,
et où $y : F \rightarrow \text{Invd}(L)$ définit $y_t : F \rightarrow K$ par la coïncidence de $y(f)$ avec la transposition de l'opérateur multiplication à gauche par $y_t(f)$; pour $n = 0$,
 $Y_{t,op}(f) = \epsilon_F(f)$.

Soit B^m l'algèbre engendrée dans $T_m(K)$ par l'espace vectoriel $Y_{t,op}^m(F)$ et l'identité de $T_m(K)$;
on a le théorème suivant:

Théorème 4.5 *L'orthogonal de B^m dans $T_m(L)$ est l'espace des relations d'ordre m : $R_m(U_x)$; et l'on a donc*

$$B_m = B^m , \quad \forall m .$$

Démonstration.

Dans le théorème 4.1 on a vu que $w \in T_m(L)$ est une relation de U_x si et seulement si :

$$< \pi_y(T(F)), \tau(w) > = 0$$

si et seulement si

$$\epsilon_L \circ \pi_y(T(F))(\tau(w)) = 0 .$$

En particulier évaluons cette expression sur $f \in F \subset T(F)$; par la linéarité de l'opérateur $\pi_y(f)$ sur $T(L)$, l'on a :

$$\epsilon_L \circ \pi_y(f)(\tau(w)) = \sum_{n \in (0, m)} \langle \otimes^n y \circ \Delta_F^{n-1}(f), \tau(w_n), \rangle = \sum_{n \in (0, m)} \langle \otimes^n y \circ \tau \circ \Delta_F^{n-1}(f), w_m \rangle ,$$

ce qui est égal à

$$\sum_{n \in (0, m)} \langle \otimes^n y \circ \Delta_{F, op}^{n-1}(f), w_m \rangle = \langle \pi_{y, op}^m(f), w \rangle .$$

où $\pi_{y, op}^m(f)$ est l'opérateur invariant à droite sur $T_m(L)$ correspondant à la multiplication à gauche par $Y_{t, op}^m(f)$ dans $T_m(K)$.

Considérons plus explicitement l'opérateur $\pi_y(f) \circ \tau$:

$$\pi_y(f) \circ \tau = \epsilon_L \circ \pi_y(f) \otimes id \circ \tau \otimes \tau \circ \Delta_L$$

où l'on a utilisé le fait que Δ_L et τ sont respectivement un morphisme d'algèbres et un anti-homomorphisme d'algèbre.

On obtient donc :

$$\pi_y(f) \circ \tau = \tau \circ \pi_{y, op}(f).$$

Donc $w \in T_m(L)$ est une relation d'ordre m de la bigèbre U_x si et seulement si pour toute suite $(f_1, f_2, \dots, f_q)$ l'on a :

$$\epsilon_L \circ \pi_y(f_q) \circ \dots \circ \pi_y(f_2) \circ \pi_y(f_1) \circ \tau(w) = 0 \text{ et } \epsilon_L \circ \pi_y(1)(\tau(w)) = 0 = \epsilon_L(w).$$

Par l'itération de la formule précédente on obtient donc que : $w \in R_m(U_x)$ si et seulement si pour toute suite $(f_1, f_2, \dots, f_q)$ l'on a :

$$\epsilon_L \circ \tau \circ \pi_{y, op}(f_q) \circ \dots \circ \pi_{y, op}(f_2) \circ \pi_{y, op}(f_1)(w) = 0 \text{ et } \epsilon_L(w) = 0 .$$

L'on a aussi $\epsilon_L \circ \tau = \epsilon_L$, et utilisant l'anti-isomorphisme entre les opérateurs invariants à droite sur $T_m(L)$ et l'algèbre des opérateurs multiplications à gauche sur $T_m(K)$ l'on obtient :

w est une relation d'ordre m de U_x si et seulement si w est orthogonal à l'algèbre B^m engendrée dans $T_m(K)$ par les opérateurs $Y_{t, op}^m(F)$ et l'identité de $T_m(K)$.

La complémentarité de ces deux constructions de $R_m(U_x)$ provient de ce

que les deux algèbres identiques qui définissent l'orthogonal de cet espace de relations, B_m et B^m sont engendrées par des sous espaces vectoriels différents.

Références

- 1) E. Mourre : Remarques sur une méthode de réalisations de bigèbres ,
et algèbres de Hopf associées à certaines réalisations , arXiv:math-ph/0312049.
- 2) E. Abe : Hopf algebras , Cambridge University Press , 1980 .
- 3) C. Kassel , M. Rosso , V. Turaev : Quantum groups and
knots invariants , Panoramas et Synthèses , 97 , (N. 7) , S.M.F.
- 4) V.G. Drinfeld : Quantum groups , proc.int.conf.math. , Berkley,California,
1986 .
- 5) S. Majid : Foundations of quantum groups theory ,
Cambridge University Press, 1995.
- 6) A. Connes , H. Moscovici : C.M.P. 198 1998 .
- 7) A. Connes , D. Kreimer : Ann.Henri Poincaré . (V 3) 2002 .
- 8) A.Connes , M. Marcolli : ArXiv: hep-th 0411114 v1 2004 .